

COMMANDER 20/20[®] Solución Tópica

ANTIPARASITARIO EXTERNO POUR-ON.



Commander 20/20 Pour on, es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y piojos (*Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus* y *Linognathus vituli*). Los estudios de campo demostraron una eficacia máxima de hasta 35 días en el control de la mosca de los cuernos. Además se ha demostrado una eficacia de hasta 8 semanas en el control de piojos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo pour-on.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Permetrina (25/75)..... 20 g

Piperonil Butóxido 20 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL

INDICACIONES

Commander 20/20 Pour on, es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y piojos (*Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus* y *Linognathus vituli*). Los estudios de campo demostraron una eficacia máxima de hasta 35 días en el control de la mosca de los cuernos. Además se ha demostrado una eficacia de hasta 8 semanas en el control de piojos.

MODO DE APLICACIÓN

Con una pistola dosificadora o con jeringa, aplicar en una línea longitudinal dorsal desde la base de la cola (grupa) hasta la región de la cruz. La aplicación a “contrapelo” permite una mejor difusión del producto sobre la piel de los animales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Contra moscas y piojos: Administrar 10 mL por animal.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- La sobreexposición y/o en sujetos susceptibles al producto, puede ocasionar efectos secundarios (alergias, rash cutáneo, otros.)
- Al aplicar el producto, usar guantes.
- En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación consulte al médico.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No aplicar próximo a fuentes de calor.
- No desechar el envase en ríos, lagos u otras fuentes de agua.
- Agitar antes de usar.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Condiciones climáticas diferentes a las presentadas en los estudios de campo pueden hacer variar la duración del efecto.
- En caso de intoxicación accidental consultar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (**CITUC 2635-3800**).

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 2 días.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL, 250 mL, 1 Litro y 3 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 1650
- Panamá: Reg. N° RQ-284-08

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario