

# DERMISOLONA<sup>®</sup> Comprimido Oral

---

ANTIINFLAMATORIO - ANTIALÉRGICO ESTEROIDAL.



Se indica como ayuda en el tratamiento de desórdenes inflamatorios no infecciosos, artropatías no sépticas y en el tratamiento de dermatitis alérgica; en la enfermedad intestinal inflamatoria crónica y como inmunosupresor en estados tumorales.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Comprimido oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiinflamatorio - Antialérgico esteroidal.

### COMPOSICIÓN

---

Cada comprimido contiene:

Prednisolona base.....20 mg

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

### INDICACIONES

---

Se indica como ayuda en el tratamiento de desórdenes inflamatorios no infecciosos, artropatías no sépticas y en el tratamiento de dermatitis alérgica; en la enfermedad intestinal inflamatoria crónica y como inmunosupresor en estados tumorales.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración oral.

#### **Dosis del principio activo:**

- Terapia antiinflamatoria y antialérgica: 0,5 a 1 mg/Kg en perros y 1 a 2 mg/Kg en gatos, cada 12 o 24 horas por 3 a 5 días. En caso de tratamientos prolongados, se recomienda reducir a la menor dosis efectiva y dar en el régimen de días alternados en la mañana para perros, y en la tarde en gatos (para respetar el ritmo circadiano).
- Como inmunosupresor: 2,2 a 3,3 mg/Kg de peso por dos días seguidos y luego 2-4 mg/Kg cada 48 horas. Evaluar la duración del tratamiento según la intensidad y remisión de los síntomas.
- Enfermedad intestinal inflamatoria crónica: 1-2 mg/Kg de peso al día por 2 a 4 semanas.

#### **Dosis del producto:**

- Como antiinflamatorio y antialérgico:

Perros:  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{2}$  comprimido/10 Kg de peso cada 12 o 24 horas por 3 a 5 días.

Gatos:  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  comprimido/5 Kg de peso cada 12 o 24 horas por 3 a 5 días.

- Como inmunosupresor: 1 - 1  $\frac{1}{2}$  comprimidos/10 Kg de peso por dos días consecutivos y luego 1 - 2 comprimidos/10 Kg, cada 48 horas. Evaluar la duración del tratamiento según la intensidad y remisión de los síntomas.
- Enfermedad inflamatoria intestinal crónica  $\frac{1}{2}$  - 1 comprimido/10 Kg de peso al día por 2 a 4 semanas en el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria crónica.

### CONTRAINDICACIONES

---

- No se debe usar en infecciones virales.
- La terapia sistémica con prednisolona está contraindicada en animales con úlcera péptica, úlcera corneal, y síndrome de Cushing.
- No administrar en animales gestantes.

### PRECAUCIONES

---

- Administrar con precaución en animales que presenten diabetes, osteoporosis, predisposición a la tromboflebitis, hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal o tuberculosis activa.
- Los efectos antiinflamatorios pueden enmascarar signos de infección.

## ADVERTENCIAS

---

- La terapia prolongada con glucocorticoides puede suprimir la actividad adrenocortical, de manera que la supresión de la terapia debe realizarse en forma graduada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

---

- Es poco probable que el uso terapéutico de Prednisolona cause efectos de tipo metabólicos asociados a los glucocorticoides. Sin embargo, en caso de ser requerido un tratamiento prolongado se debe proporcionar una mayor ingesta de proteínas para mantener al animal en un balance de Nitrógeno positivo. Un efecto de retraso en la cicatrización de heridas no ha sido descrito, sin embargo tal posibilidad debe ser considerada al ser utilizado en cirugía.
- En tratamientos prolongados se describe un aumento en la incidencia de osteoporosis, especialmente en perros de edad avanzada. No se recomienda su uso durante la fase de recuperación de una fractura ósea.
- Los efectos inmunosupresores y la modificación de la respuesta inflamatoria causada por glucocorticoides pueden facilitar la progresión de enfermedades infecciosas concomitantes.

## OBSERVACIONES

---

Prohibida su venta fraccionada.

## CONSERVACIÓN

---

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Estuche con 10 comprimidos.

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

**REGISTROS**

---

Reg. SAG N° 1745

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario