

HASYUN® Solución Inyectable

ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.



Indicado en el tratamiento de shock; en desórdenes inflamatorios y alérgicos en perros, gatos, bovinos, caballos y cerdos; cetosis primaria en bovinos; inducción de parto en bovinos, ovinos y cerdos e hipoadrenocorticismo.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, cerdos, caballos, ovinos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio esteroidal.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:

Dexametasona Sodio Fosfato.....5,26 mg

(Equivalente a 4 mg de Dexametasona base)

Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de shock; en desórdenes inflamatorios y alérgicos en perros, gatos, bovinos, caballos y cerdos; cetosis primaria en bovinos; inducción de parto en bovinos, ovinos y cerdos e hipoadrenocorticismo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intravenosa, intramuscular.

ESPECIE	DOSIS DEL PRINCIPIO ACTIVO SEGÚN TERAPIA	DOSIS DEL PRODUCTO SEGÚN TERAPIA
Perros	Desórdenes inflamatorios: 0,05-0,2 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 4-6 mg/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.	Desórdenes inflamatorios: 0,125-0,5 mL/10 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 1-1,5 mL/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.
Gatos	Desórdenes inflamatorios: 0,1-0,3 mg/Kg de peso vivo al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 4-6 mg/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.	Desórdenes inflamatorios: 0,1-0,3 mL/4Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 1-1,5 mL/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.
Bovinos	Desórdenes inflamatorios, cetosis: 0,0125- 0,05 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Inducción de parto: 0,05-0,075 mg/Kg de peso, vía I.M, en dosis única.	Desórdenes inflamatorios, cetosis: 1,25-5 mL/400 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Inducción de parto: 5- 7,5 mL/400 Kg de peso, vía I.M., en dosis única.
Cerdos	Desórdenes inflamatorios: 0,02-0,08 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Shock: 0,5-5 mg/Kg, vía I.V.	Desórdenes inflamatorios: 0,5-2 mL/100 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Shock: 0,125-1,25 mL/Kg, vía I.V.
Ovinos	Inducción del parto: 0,16-0,32 mg/Kg de peso, vía I.M, en dosis única.	Inducción del parto: 2- 4 mL/50 Kg de peso, vía I.M., en dosis única.
Caballos	Desórdenes inflamatorios: 0,005-0,01 mg/Kg de peso al día, vía I.V. Shock: 4-6 mg/Kg, vía I.V.	Desórdenes inflamatorios: 0,625-1,25 mL/500 Kg al día, vía I.V. Shock: 1 a 1,5 mL/Kg, vía I.V.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en infecciones virales.
- No usar en animales con tuberculosis, nefritis crónica, síndrome de Cushing, úlcera péptica o diabetes (excepto si se usa como terapia de emergencia).
- No administrar en hembras gestantes.

PRECAUCIONES

- En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días sucesivos.
- De requerirse un efecto corticosteroide permanente, la terapia oral es la recomendada.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Bovinos, Ovinos, Cerdos:

- Carne: 5 días.
- Leche: 3 días.

Caballos:

No administrar a caballos cuya carne se destine al consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N °: 1366
- Uruguay: Reg. N° MGAP A-4495

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario