

# MOSKIMIC® FORTE - Solución Tópica

---

ANTIPARASITARIO *POUR ON*.



Moskimic® Forte *Pour on* es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Puede ser utilizado en hembras durante la preñez y lactancia.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos.

### DESCRIPCIÓN

---

Indicado para el control y eliminación de la mosca de los cuernos en bovinos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución tópica de uso externo.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario *pour on*.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL contiene:

Permetrina .....10 g  
Piperonil Butóxido.....30 g  
Excipientes c.s.p.....100 mL

## INDICACIONES

---

Moskimic® Forte *Pour on* es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Puede ser utilizado en hembras durante la preñez y lactancia.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Aplicación tópica.

### **Dosis de los principios activos:**

1 g de Permetrina y 3 g de Piperonil Butóxido por animal. Dosis única. Repetir el tratamiento a los 35 días.

### **Dosis del producto:**

Aplicar 10 mL por animal. Dosis única. Repetir el tratamiento a los 35 días.

Con una pistola dosificadora o con jeringa, aplicar en una línea longitudinal dorsal desde la base de la cola (grupa) hasta la región de la cruz.

## CONTRAINDICACIONES

---

No administrar en animales con hipersensibilidad a alguno de los principios activos

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- Aplicar con precaución en el ganado joven o debilitado
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- No aplicar el producto próximo a fuentes de calor.
- Evitar el contacto con los ojos.

- La sobreexposición en sujetos susceptibles al producto, puede ocasionar efectos secundarios (alergias, rash cutáneo, otros).
- Al aplicar el producto, usar guantes.
- En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación consulte al médico

## ADVERTENCIAS

---

- Aplicar con precaución en el ganado joven o debilitado
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos
- En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (**CITUC**) 2635-3800.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

Las soluciones tópicas conteniendo Permetrina pueden causar irritación dérmica en los animales tratados.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Carne:** 0 días.

**Leche:** 2 días.

## OBSERVACIONES

---

### **Precauciones para eliminar el material de desecho:**

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original.
- No arrojar el envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua.
- No desechar el envase vacío o con restos de producto junto con los desechos domésticos.
- No reutilizar el envase.
- Disponer los desechos de este producto, en lo posible, con empresas que presten el servicio para eliminar desechos especiales.

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Envase con 100 mL, 250 mL, 1 Litro y 3 Litros.

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

- Chile: Reg. SAG N° 1370
- Rep. Dominicana: Reg. N° 7570

## NOTA

---

### **Precauciones para eliminar el material de desecho:**

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original.
- No arrojar el envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua.
- No desechar el envase vacío o con restos de producto junto con los desechos domésticos.
- No reutilizar el envase.
- Disponer los desechos de este producto en lo posible con empresas que presten el servicio para eliminar desechos especiales.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario