

FICHA TÉCNICA

ROTAVEC® CORONA

Vacuna inactivada Rotavirus Bovino, Coronavirus Bovino y *Escherichia coli*
Emulsión inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

Rotavirus Bovino, Cepa UK-Compton, Grupo A, Serotipo G6 P5	10 ^{7.6} – 10 ^{7.9} TCID ₅₀
Coronavirus Bovino, Cepa Mebus	150 – 230 unidades ELISA
<i>Escherichia coli</i> , Cepa CN7985, Expresando Adhesina F5 (K99)	100 – 120 unidades
Excipientes c.s.p.	2 ml
Adyuvantes: Aceite mineral, Hidróxido de aluminio	
Preservante: Timerosal	

Indicaciones de uso:

Inmunización pasiva de terneros, como ayuda en la prevención de la diarrea neonatal producida por Rotavirus Bovino, Coronavirus Bovino y *Escherichia coli* que expresa Adhesina F5 (K99). Los anticuerpos calostrales han demostrado reducir la gravedad de la diarrea causada por *E. coli* F5 (K99), reducir la incidencia de la diarrea causada por Rotavirus y reducir al diseminación viral por parte de los terneros infectados con Rotavirus y Coronavirus.

Especies de destino:

Bovinos, vacas y vaquillas preñadas.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

2 ml.

Frecuencia y duración del tratamiento:

Dosis única.

Vía de administración:

Intramuscular, en la tabla del cuello.

Edad o peso:

Entre 12 a 3 semanas antes de la fecha probable de parto.

Condición fisiológica:

Hembras preñadas.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Administrar en forma aséptica.

FICHA TÉCNICA

Alimentación con calostro:

- Terneros amamantados de forma natural: Recibirán el calostro directamente a partir de las vacas vacunadas.
- Terneros alimentados artificialmente con calostro mezclado: El calostro se puede almacenar bajo 20°C pero debe utilizarse lo antes posible, ya que los anticuerpos pueden caer hasta un 50% luego de 28 días de almacenamiento. Se recomienda almacenarlo a 4°C. Se debe alimentar a los terneros a razón de 2,5 a 3,5 litros por día (de acuerdo al tamaño corporal) durante las 2 primeras semanas de vida.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Se debe asegurar que los terneros recibirán calostro de las madres vacunadas en las 6 horas siguientes al nacimiento y durante las 2-4 primeras semanas de vida.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto a la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Ocasionalmente se puede observar una leve inflamación de hasta 1 cm en el sitio de inyección, la cual se absorberá dentro de 14 a 21 días.
Pueden ocurrir ocasionalmente reacciones de hipersensibilidad. En dichos casos se debe administrar de inmediato un tratamiento apropiado como adrenalina.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Rovatec® Corona contiene aceite mineral. Una inyección accidental o autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, particularmente si es inyectado en una articulación o dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no recibe una pronta atención médica. En caso de ser inyectado accidentalmente con este producto médico veterinario, busque atención médica inmediata incluso si una cantidad muy pequeña ha sido inyectada y lleve el inserto con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque nuevamente atención médica.

FICHA TÉCNICA

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° a 8°C. No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo un frasco de 10 o 40 ml, equivalente a 5 o 20 dosis. Incluye prospecto interno.

Fabricado por:

Burgwedel Biotech GmbH,
Im Langen Felde 5,
30938 Burgwedel,
Alemania

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
Reg SAG N°2340-B