

# AMPLIFORT®

## Antibióticos - Suspensión Intramamaria

Reg. SAG N° 0736-B

### COMPOSICIÓN

Cada jeringa (1 dosis) contiene:	
Ampicilina sódica (Equivalente a 75 mg Ampicilina base)	80 mg
Cloxacilina sódica (Equivalente a 200 mg Cloxacilina base)	210 mg
Excipientes c.s.p.	1 jeringa

### ESPECIES DE DESTINO

Bovinos (vacas lecheras).

### INDICACIONES

Terapia clínica de las mastitis bacterianas producidas en bovinos por gérmenes sensibles a la ampicilina y cloxacilina, según antibiograma.

### DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía intramamaria 75 mg de ampicilina + 200 mg de cloxacilina por cuarto (equivalente a una jeringa por cuarto) cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis.

### PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 7 días.  
Leche: 60 horas.

### CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

Los animales deben ser tratados al detectarse los primeros signos de mastitis, siempre durante el periodo de lactación. Después del ordeño a fondo antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto, dar un masaje a la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión. Puede utilizarse durante la gestación.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, protegido de la luz. No congelar.

### PRESENTACIÓN

Cajas de 4 y 12 jeringas.

USO VETERINARIO - Venta bajo receta Médico Veterinaria

**\*\*Esta ficha es sólo una referencia de las características del producto. Para mayor información, consultar el documento oficial disponible en [www.centrovvet.com](http://www.centrovvet.com).**

