

CALDISPERT P500[®]

**Solución inyectable
REG. SAG Nº 975**



COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Borogluconato de calcio	60 g
(equivale a 50 g de Calcio Gluconato y 9 g de ácido bórico)	
Glicerofosfato de calcio	0.5 g
Sulfato de magnesio desecado	0.375 g
Excipientes c.s.p	

ESPECIES:

Bovinos, Ovinos, Cerdos.

INDICACIONES:

Paresia obstétrica pre y post-parto debida a hipocalcemia aguda. Raquitismo y osteomalacia (mal de los avenales). Hipomagnesemia (tetania de las praderas).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Inyectable intravenoso lento, intramuscular y subcutáneo distribuido en varios lugares, o intraperitoneal sólo en bovinos.

Dosis:

Bovinos: 20 ml/100 kg pv

Cerdos y Ovinos: 10 ml/50 kg pv.

En casos de paresia post parto el tratamiento podrá repetirse cada 12 horas hasta un máximo de 3 meses.

EFFECTOS NO DESEADOS:

En casos de inyección intravenosa, subcutánea o intramuscular puede presentarse una ligera reacción inflamatoria perivascular o en el punto de inyección, que desaparece en algunos días sin necesidad de tratamiento. La inyección intramuscular puede provocar cierto dolor local.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

La aplicación intravenosa debe hacerse de forma lenta, de lo contrario puede provocar arritmias o paro cardiaco. En épocas muy frías entibiar a no más de 30°C.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 100, 250, 500 cc y 1L.

PERIODO DE RESGUARDO:

0 días.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA