

DEXABIOPEN®

Antibióticos – Suspensión Inyectable

Reg. SAG N° 111-B

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:	
Penicilina G Procaína	200.000 U.I.
Dihidroestreptomicina sulfato (equivalente a 200 mg de dihidroestreptomicina)	250 mg
Dexametasona fosfato sódico (equivalente a 500 µg de dexametasona)	0,68 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL



ESPECIES DE DESTINO

Equinos, Bovinos, Cerdos, Ovinos, Caprinos y Perros.

INDICACIONES

En todos los procesos causados por microorganismos sensibles a la penicilina y a la estreptomicina y en las infecciones mixtas. Muy recomendable también en los procesos secundarios a virosis. En general, en septicemias hemorrágicas, colibacilosis, coriza, complicaciones de influenza, neumonías, bronconeumonías, mastitis, metritis, procesos supurados que no responden a la aplicación de penicilina como tratamiento único, salmonelosis, leptospirosis, espiroquetas, gangrenas, tétanos, carbunco.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía intramuscular estricta 1 mL de Dexabiopen® por cada 10 - 20 kg peso al día (10.000 - 20.000 U.I./kg peso de Penicilina G Procaína + 10 - 20 mg/kg de peso de Dihidroestreptomicina + 0,025 - 0,05 mg/kg de Dexametasona al día), durante 3 días.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 30 días.
Leche: 60 horas.
No administrar a ovejas cuya leche sea destinada a consumo humano.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

No administrar en gatos ni en roedores.
No administrar en animales con edad inferior a un mes.
No emplear en el último tercio de la gestación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 25°C, y al abrigo de la luz.

PRESENTACIÓN

Envases de 100 mL.

USO VETERINARIO - Venta bajo receta Médico Veterinaria

****Esta ficha es sólo una referencia de las características del producto. Para mayor información, consultar el documento oficial disponible en www.centrovvet.com.**

