



MEFLOSYL®

Nombre Comercial

Meflosyl®

Número de Registro oficial del SAG

524

Nombre del Laboratorio Productor

Zoetis España

Nombre del Laboratorio Distribuidor

Zoetis de Chile S.A.

Tipo de Producto

Antiinflamatorio, Analgésico y Antipirético no esteroideal. Solución inyectable

Composición

Flunixin Meglumina 83 mg/mL

Indicaciones

Bovinos: control de inflamación aguda asociada a enfermedad respiratoria.

Caballos: control del dolor e inflamación asociados a trastornos músculo esqueléticos en fase aguda y crónica. Control del dolor en caso de enteritis y cuadros de cólicos.

Dosificación

Bovinos: Inyectar 2 mL/45 kg de peso cada 24 horas hasta por 3 días. Caballos Inyectar 1 mL/45 kg de peso cada 24 horas hasta por 3 días.

Vía de administración

En ambas especies vía endovenosa

Contraindicaciones

No administrar en yeguas preñadas, no en animales menores a 3 días de vida. Su uso está igualmente contraindicado en animales con insuficiencia hepática, renal o cardíaca.

Período de resguardo

Bovinos: Leche: 48 horas. Carne: 7 días

Caballos: No usar en caballos destinados al consumo humano

Presentación

Frasco de 50 mL