

F-L-T[®] Shampoo

SHAMPOO



- Dermopatías donde sea necesario un efecto antimicrobiano, antipruriginoso, acaricida y queratolítico.
- Seborrea, piodermatitis, eczemas, dermatitis, sarna, dermatomycosis, etc.
- Higiene periódica preventiva.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Shampoo

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Peróxido de Benzoilo.....2,5 g

Azufre..... 2,0 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

- Dermopatías donde sea necesario un efecto antimicrobiano, antipruriginoso, acaricida y queratolítico.
- Seborrea, piodermitis, eczemas, dermatitis, sarna, dermatomicosis, etc.
- Higiene periódica preventiva.

MODO DE APLICACIÓN

- Bañar previamente con un shampoo neutro.
- Aplicar F-L-T en cantidad suficiente para lograr abundante espuma.
- Frotar 2-3 minutos.
- Dejar reposar por 5 minutos y enjuagar cuidadosamente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en animales que presenten cuadros de seborrea seca o escamosis severa.
- No usar durante la gestación y lactancia.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS ADVERSOS

- Algunos efectos adversos observados tras la administración tópica de Peróxido de Benzoilo son hiperemia y la formación de ampollas.
- Los animales con piel sensible pueden desarrollar sequedad excesiva o irritación.
- El producto podría generar tinción de animales con pelaje claro.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta de Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 150 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 0940
- Panamá: Reg. N° RQ-266-07

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario