

# ZANIL® 10%

## Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 1890-B

### COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Oxitetraciclina 10 g  
Excipientes c.s.p. 100 g

### ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos broiler) y Cerdos.

### INDICACIONES

**Aves:** Enfermedad Crónica Respiratoria, Sinovitis infecciosa.

**Cerdos:** Cuadros neumónicos, Leptospirosis.

### DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administración vía oral en el alimento.

**Aves (pollos broiler):** 20 a 59 mg principio activo (equivalente 200 a 590 mg Zanil® 10%) por kg peso por día en el alimento durante 7 a 14 días.

**Cerdos:** 22 mg principio activo (equivalente a 220 mg Zanil® 10%) por kg de peso por día en el alimento durante 5 a 10 días. En caso de Leptospirosis la dosis es de 28 - 30 mg por kg de peso por 10 a 15 días.

### PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 10 días.

Aves: 7 días.

### CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

No administrar a cerdas gestantes.

El producto no debe ser administrado en animales con insuficiencia renal.

No administrar conjuntamente con sales polivalentes (Ca, Mg, Cu, Fe).

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, en lugar seco y protegido de la luz solar.

### PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 10 kg.

USO VETERINARIO - Venta bajo receta Médico Veterinaria

**\*\* Esta ficha es sólo una referencia de las características del producto. Para mayor información, consultar el documento oficial disponible en [www.centrovvet.com](http://www.centrovvet.com).**

